

# BERIGTEN VAN VERSCHILLENDE AARD.

*Chronologisch overzicht der vulkanische verschijnselen op Java, gedurende 1853.*

Datum.	A. Aardbevingen, waargenomen te:	Rigting.	Uur van den dag.	Stand der maand.	Bewogen oppervlakte □ palen.	Java Courant. Nat. Tijdschr.
27 Jan.	Tjilatjap, 3 schokken kort achter een.	O.—W.	2. n. m.	V. M. + 2. d.	1000.	12.
8 Mei	Probolingo, ligte schok.	?	'nachts.	N. M.	300.	N.T. IV. 203. 43.
21 Aug.	Bezoeki, 2 schokken.	Z.—N.	4. n. m.	V. M. + 3.	400.	71. IV. 636.
28 Okt.	Galoe, horizontaal.	Z.W.—N.O.	7. v. m.	L. K. + 3.	200.	93. V. 365.
2 Nov.	Galoe, vertikaal.	?	4. v. m.	N. M.	200.	100. Java B. 70.
30 Nov.	Galoe, 79° F., zware lucht.	Z.W.—N.O.	2. v. m.	N. M.	200.	100.

Bewogen aardoppervlakte, 2,300. alzoo verreweg minder dan in 1851, 1852 en 1850. Ongeveer 200 □ palen werden tot driemaal bewogen.

## Berguitbarstingen. Aardvallen.

14 Maart. Buitengewone uitstooting van rook en asch bij groote kolommen, uit den Gedeh (Res. Preanger.) (Nat. Tijds. IV. 204).

J. HAGEMAN, Jcz.

## *Antennarius notophthalmus, eene nieuwe soort van de Meeuwenbaai.*

Tijdens een' togt naar de Meeuwenbaai aan Java's westhoek, ondernomen ter opsporing van steenkolenlagen aldaar, was ik in de gelegenheid de volgende vischsoorten waar te nemen,

welke met een werpnet langs het deels zandachtig deels koraalachtig strand der Meeuwenbaai werden gevangen.

- |                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Upeneoides bivittatus Blkr. | 10. Acanthurus triostegus CV.       |
| 2. Pristipoma nageb Rüpp.      | 11. Mugil cunnesius CV.             |
| 3. Ambassis Dussumierii CV.    | 12. „ javanicus Blkr.               |
| 4. Mesoprion decussatus CV.    | 13. Periophthalmus Schlosseri CV.   |
| 5. Sillago acuta CV.           | 14. Antennarius notophthalmus Blkr. |
| 6. Gerres filamentosus CV.     | 15. Spratella fimbriata CV.         |
| 7. Caranx Forsteri CV.         | 16. Engraulis Brownii CV.           |
| 8. Gazza tapeinosoma Blkr.     | 17. „ encrasicholoïdes Blkr.        |
| 9. Equula ensifera CV.         | 18. Solea maculata Cuv.             |

Van deze soorten welke ik, op No. 14 na reeds elders heb beschreven, is de *Antennarius* nieuw voor de wetenschap.

*Antennarius notophthalmus* Blkr.

Antenn. corpore ovali compresso, altitudine  $2\frac{1}{2}$  circiter in ejus longitudine, latitudine 2 circiter in ejus altitudine; oculis diametro 5 ad 6 circiter in longitudine maxillae superioris; rictu subverticali postrosum descendente; dentibus intermaxillaribus et inframaxillaribus pluriseriatis gracilibus acutis subaequalibus; vomero-palatinis triseriatis in thurmas 4 oblongas arcum efficientes dispositis, thurmis spatio glabro a se invicem remotis; lingua antice membrana libera lanceolata acutissime producta; apertura branchiali rotunda oculo majore; cute toto corpore spinulis parvis plurimis bifurcatis conspicuis scabra; capite superne dorsoque antice tuberculis aliquot osseis parvis longitudinaliter seriatis; fimbriis capite superne, dorso, lateribus, ventre pinnisque parvis parvis, capite inferne 12 p. m. oculo duplo ad plus triplo longioribus plus minusve arborescentibus; radio rostro libero tuberculo scabriuseculo apice rostri inserto  $6\frac{1}{2}$  circiter in longitudine corporis, apice clavato fimbriato; pinna dorsali spinosa spina 1<sup>a</sup> libera obtusa maxime antrorsum flexili, spina 2<sup>a</sup> spina 1<sup>a</sup> multo minus duplo, maxilla superiore paulo longiore, membrana lata paulo antrorsum flexili; dorsali radiosa analique rotundatis altitudine subaequalibus, dorsali anali plus duplo longiore; caudali rotundata  $3\frac{1}{2}$  in longitudine corporis; ventralibus maxilla superiore brevioribus; colore corpore pimisque olivaceo-violaceo ventre dilutiore; toto corpore violaceo-nigro reticulato cellulis retis irregularibus plurimis oculo multo majoribus; cirris capite inferne violaceo-nigris, ceteris flavis; pinnis apicibus radorum flavis; dorsali et anali vittis pluribus longitudinalibus irregularibus obliquis violaceo-nigris, dorsali basin versus radium 8<sup>m</sup> inter et 11<sup>m</sup> ocello magno nigro flavo annulato; pectoralibus ventralibusque violaceo-nigricante reticulatis; caudali vittis pluribus transversis violaceo-nigris ex par-

te vittis obliquis unitis; basi caudalis superne ocello nigro flavo cincto; radio rostrali libero fusco annulato.

B. 6. D. 2 — 12 (poster. 4 fiss.). P. 9 (simplic.). A. 7 (omn. fiss.). C. 9 (omn. fiss.).

Habit. Djungkulan, in sinu Meeuwenbaai dicto, Javae austro-occidentalis.

Longitudo speciminis unici 126'''.

Deze soort is gemakkelijk herkenbaar aan de netsgewijze teekening des ligchaams en de bandteekening der vertikale vinnen, alsmede aan de groote tevens éénige zwarte met geel gezoomde rugvinvlek.

BATAVIA, 10 December 1853.

P. BLEEKER.

---

*Personalien.*

Het korresponderend lid de heer H. ZOLLINGER te Kussnach is voornemens zich weder naar Java te begeven.

Het korresponderend lid, de heer F. JUNGHUIN is insgelijks op het punt weder naar Java te vertrekken.

Benoemd tot ridder der orde van het Legioen van eer van Frankrijk, het lid de heer P. VAN REES, resident van Batavia.

Overgeplaatst van Sumatra's westkust naar Soerabaja het lid de heer H. W. SCHWANEFELD, officier van gezondheid der 2<sup>e</sup> kl.

Met eene gouvernements zending naar de westkust van Borneo belast het lid de heer H. VON GAFFRON.

Te Batavia aangekomen, het lid de heer A. J. ANDRESEN, luitenant kolonel kommandant der troepen ter Borneo's Westkust (sedert weder naar Sambas vertrokken).

Te Batavia aangekomen, het lid de heer F. C. SCHMITT, officier van gezondheid 2<sup>e</sup> kl.

Naar Nederland vertrokken, het honorair lid de heer W. BOSCH, chef der geneeskundige dienst.

Naar Nederland vertrokken, het lid de heer C. H. G. STEURWALD, luitenant kolonel der artillerie.

Afgetreden als lid wegens vertrek naar Nederland, de heer L. W. BELJERINCK, oud majoor der infanterie.

Overgeplaatst van Willem I naar Batavia, het lid de heer Jkhr. T. J. H. GEYERS, majoor der genie.